

PESQUISA DE REFLUXO GASTROESOFÁGICO

É um exame que utiliza uma pequena quantidade de material radioativo (traçador) para avaliar a presença de refluxo do material do estômago para o esôfago.

Esse material radioativo não provoca reação, não é prejudicial à saúde e a exposição à radiação é mínima.

PREPARO

É necessário um jejum de 4 horas. Recém-nascidos podem ter o jejum reduzido para 2 horas.

Para adultos, solicitamos que traga 1 litro de iogurte, leite ou leite de soja.

Para crianças, trazer leite (de vaca ou de soja) ou iogurte (+/- 1 litro) e duas mamadeiras. Caso a amamentação seja exclusiva de leite materno, trazer somente uma mamadeira.

A critério médico, suspender medicamentos como: Bromoprida, Prepulsid, Digesan, Plasil, Plamet etc. dois dias antes do exame.

COMO É FEITO O EXAME?

Uma pequena quantidade de material radioativo será adicionada a uma porção do leite. Essa solução será fornecida ao paciente que, em seguida, deverá ingerir o restante do leite.

É importante que todo o leite seja ingerido para que o estômago fique cheio, proporcionando, dessa forma, a ocorrência de um eventual refluxo.

Imediatamente após a ingestão do leite, o paciente será encaminhado à sala de exame e posicionado na maca do aparelho. Ele deverá permanecer deitado, imóvel, por aproximadamente 20 minutos. Caso o paciente seja criança, é necessário o uso de faixas adesivas para restrição. Esse procedimento é necessário, porque a sedação não é recomendada.

Quando se pesquisa aspiração pulmonar, o paciente deverá retornar à clínica de 4 a 24 horas após o procedimento. Imagens do tórax serão adquiridas para avaliar se o traçador ingerido se acumulou nos pulmões. Neste caso, o paciente será novamente posicionado na maca do aparelho e permanecerá deitado de 5 a 10 minutos.

Responsável: Equipe técnica da DIMEN. Versão 05/2016.