

# ORIENTAÇÕES PARA CINTILOGRAFIA COM OCTREOTIDE

---

## PREPARO

---

- Dieta normal.
- O paciente deverá suspender o uso de somatostatina (SANDOSTATIN) pelo menos 1 dia antes do exame. Caso esteja fazendo uso de somatostatina de depósito (SANDOSTATIN LAR) o período a ser suspenso é de 4 a 6 semanas. Todo medicamento deverá ser suspenso somente após autorização do médico solicitante.
- Os exames de medicina nuclear não são recomendados para mulheres grávidas e em período de amamentação.

## COMO É FEITO O EXAME?

---

- Após a confecção da ficha cadastral, o paciente será encaminhado à sala de injeção.
- Uma pequena quantidade do material radioativo será injetada na veia do paciente, preferencialmente do antebraço.
- O paciente deverá aguardar de 4 a 6 horas após a injeção para a aquisição das imagens. Não é necessário que o paciente aguarde na clínica neste período de espera.
- Ao retornar, o paciente será encaminhado à sala de exame e será orientado a permanecer deitado na maca do aparelho por cerca de 30 a 40 minutos para a obtenção das imagens.
- Após o término, o paciente será liberado e orientado a retornar em 24 horas para nova aquisição de imagens, semelhantes ao primeiro procedimento.

*Responsável: Equipe técnica da DIMEN Versão 02/2013*