

# ORIENTAÇÕES PARA PESQUISA DE HEMANGIOMA HEPÁTICO

---

## PREPARO

---

Os exames de medicina nuclear não são recomendados para mulheres grávidas e em período de amamentação.

Não é necessário jejum.

Suspender medicamentos tais como: Hidralazina, Prazosin, Propranolol, Digoxina, Dextrose, Doxorubicina, contraste com Iodo, Metildopa, Quinidina e Heparina (somente sob autorização Médica).

Comunicar o médico nuclear se o paciente está com anemia ou se realizou transfusão sanguínea recentemente.

## COMO É FEITO O EXAME?

---

- Ao chegar à clínica, o paciente será atendido por uma de nossas recepcionistas para a confecção da ficha cadastral.
- Em seguida, será encaminhado à sala de injeção.
- Uma veia, preferencialmente do antebraço, será puncionada e um medicamento será injetado por esta via. O paciente deverá aguardar 20 minutos e outra injeção será administrada, também por via venosa.
- O paciente será encaminhado à sala de exames e posicionado na maca do aparelho.
- Imagens serão adquiridas aos 10-20 minutos após a última injeção e 3 horas após.
- Duração do exame: aproximadamente 4 horas.

*Responsável: Equipe técnica da DIMEN Versão 02/2013*