

# ORIENTAÇÕES PARA TERAPIA COM $^{177}\text{Lu}$ -DOTATATE

---

## PREPARO

---

- O paciente deverá agendar uma consulta com um dos nossos médicos nucleares. Nesta consulta o médico irá avaliar as condições clínicas do paciente e os exames recentes (cintilografia com análogo da somatostatina, hemograma, uréia, creatinina, PETCT, ressonância magnética, tomografia computadorizada, este laudo anátomo-patológico e imuno-histoquímico da lesão biopsiada), além de orientar sobre a terapia, benefícios e possíveis complicações.
- Jejum de 6 a 8 horas.
- Suspende terapia com análogos da somatostatina de curta duração (Octreotide/Sandostatin e Pasireotide/Signifor) por 48 horas e de longa duração (Lanreotide/Somatuline) por um mês.
- Essa terapia não é indicada para mulheres grávidas ou em período de amamentação.

## COMO É FEITO O EXAME?

---

- Ao chegar à clínica, o paciente será atendido por uma de nossas recepcionistas para a confecção da ficha cadastral.
- Em seguida, será encaminhado para internação hospitalar (em geral, durante 12 horas) quando necessário.
- Uma veia periférica de ambos os membros superiores será puncionada e mantida com soro fisiológico.
- Uma solução de aminoácidos nefroprotetores será infundida, durante 4 horas, em uma das veias puncionadas.
- O agente radioativo será infundido em outra veia, 30 a 60 minutos antes do término da solução de aminoácidos.
- Após o término da infusão do agente radioativo, o paciente permanecerá com a veia do membro contra-lateral puncionada para hidratação e observação por mais duas horas.
- Após a avaliação clínica, o paciente poderá receber alta hospitalar com orientações de retorno à unidade para obtenção de imagens do corpo inteiro.