

# ORIENTAÇÕES PARA PET/CT COM DOTATATE – GALIO<sup>68</sup>

## PREPARO

---

- O paciente deverá suspender o uso de somatostatina (SANDOSTATIN) pelo menos 1 dia antes do exame. Caso esteja fazendo uso de somatostatina de depósito (SANDOSTATIN LAR) o período a ser suspenso é de 4 a 6 semanas. Todo medicamento deverá ser suspenso somente após autorização do médico solicitante;
- Os exames de PET/CT não são recomendados para mulheres grávidas e em período de amamentação;
- **No dia do exame:**
- O exame deverá ser realizado com jejum de 6 horas. Caso o seu exame esteja agendado no fim a manhã, o desjejum estará liberado desde que se respeite o jejum de 6 horas antes do exame e da dieta prescrita.
- Trazer exames anteriores, uma troca de roupa e solicitação médica.

## COMO É FEITO O EXAME?

---

Após o atendimento inicial na recepção e a realização da entrevista clínica, o paciente será encaminhado à sala de preparo, onde será medida a glicemia. Se o resultado da glicemia estiver dentro dos limites permitidos para o exame, uma veia do membro superior será puncionada e mantida com soro fisiológico.

Uma dose do traçador radioativo será administrada pelo acesso venoso e o paciente deverá permanecer em repouso, por aproximadamente, 1 hora.

Em seguida, o paciente será encaminhado à sala de exame. Durante todo o tempo da realização deste, o paciente deverá manter-se imóvel, deitado na maca do aparelho.

O exame terá início pela tomografia computadorizada, fase que tem uma duração rápida, podendo ser ou não utilizado o contraste radiológico.

O tempo médio desse exame é de 25 a 40 minutos e, eventualmente, imagens tardias adicionais serão necessárias para complementar o exame.

### OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

Não há a necessidade de suspender os medicamentos em uso, exceto em casos de diabetes. O uso de Metformina deverá ser suspenso no dia do exame até 48 horas após, caso seja utilizado contraste radiológico.

Os pacientes que fazem o uso de Insulina deverão consultar os médicos da clínica para que recebam orientações mais específicas de seu preparo.

Em casos de avaliação de câncer da tireoide, é necessário consultar o médico da clínica para a possível suspensão do hormônio.

- Em caso de melanoma, o tempo do cliente no aparelho poderá ser maior.

É importante trazer os exames anteriores, tais como resultado anatomopatológico, tomografia computadorizada, ressonância magnética e ultrassonografia, o pedido médico e uma troca de roupa.

Se for mulher, não poderá realizar o exame em caso de gravidez ou de suspeita de gravidez.