

PESQUISA DE SANGRAMENTO INTERMITENTE (HEMORRAGIAS NÃO ATIVAS)

O objetivo desse exame é detectar foco(s) de sangramento intestinal num curto período de até 24 horas.

Utilizamos medicamentos para que uma pequena amostra de seus glóbulos vermelhos se torne radioativa.

Esse material radioativo não provoca reação, não é prejudicial à saúde e a exposição à radiação é mínima.

PREPARO

- Suspenda os medicamentos: hidralazina, prazonin e propranolol por 48 horas.
- Os medicamentos, tais como: Digoxina, Metildopa, Penicilina, Quinidina, Heparina, Dextrose, Doxorubicina e contraste com iodo somente com a autorização do seu médico.
- O paciente deverá vir à clínica com 30 minutos de antecedência do horário agendado para a administração da 1ª medicação.

COMO É FEITO O EXAME?

- Após o preenchimento da ficha de cadastro e a realização da entrevista clínica, você será encaminhado à sala de injeção e receberá um medicamento na veia, preferencialmente do antebraço.
- Esse medicamento faz com que uma amostra de suas hemácias (glóbulos vermelhos) se torne ávida ao tecnécio, que é a substância radioativa necessária para a formação das imagens.
- Após 20 minutos de espera, você será encaminhado à sala de exames e receberá outra injeção na veia. Várias imagens sequenciais serão, então, obtidas durante 1 hora. A aquisição de outras imagens, num período de 24 horas, poderá ser necessária para que possamos identificar se houve ou não sangramento. Alertamos que esse exame é demorado, pois requer a aquisição de várias imagens.