

ORIENTAÇÕES PARA PETCT COM ⁶⁸Ga-DOTATATE

PREPARO

Na véspera do exame:

- O paciente deverá suspender o uso de somatostatina (SANDOSTATIN) pelo menos 1 dia antes do exame. Caso esteja fazendo o uso de somatostatina de depósito (SANDOSTATIN LAR), o período de suspensão é de 4 a 6 semanas. Todo medicamento deverá ser suspenso somente com a autorização do médico solicitante.

No dia do exame:

- O exame deverá ser realizado com jejum de 6 horas (para pacientes que realizarão o exame com contraste iodado). Caso o seu exame esteja agendado no fim da manhã, o desjejum estará liberado desde que se respeite o jejum de 6 horas antes do exame.
- Tomar bastante água (pelo menos 3 copos) antes do exame, podendo ir ao banheiro normalmente.
- Recomenda-se vestir roupas leves e sem adereços de metal.
- Trazer os exames de imagem anteriores, dosagem de creatinina recente, uma troca de roupa e solicitação médica.

COMO É FEITO O EXAME?

Após o atendimento inicial na recepção e a realização da entrevista clínica, o paciente será encaminhado à sala de preparo e uma veia do membro superior será puncionada e mantida com soro fisiológico.

Uma dose do traçador radioativo será administrada pelo acesso venoso e o paciente deverá permanecer em repouso por aproximadamente 1 hora.

Em seguida, o paciente será encaminhado à sala de exame. Durante todo o tempo da realização deste, o paciente deverá permanecer imóvel, deitado na maca do aparelho.

O exame terá início pela tomografia computadorizada, fase de duração rápida, podendo ser ou não utilizado contraste iodado radiológico.

O tempo médio desse exame é de 30 a 60 minutos e, eventualmente, imagens tardias adicionais serão necessárias para complementar o exame.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

O uso de metiformina deverá ser suspenso no dia do exame até 48 horas após, caso seja utilizado contraste radiológico.

É importante trazer os exames anteriores, tais como resultado anátomo-patológico, tomografia computadorizada, ressonância magnética e ultrassonografia, o pedido médico e uma troca de roupa.

Se for mulher, não poderá realizar o exame em caso de gravidez ou suspeita de gravidez.

