

# ORIENTAÇÕES PARA CINTILOGRAFIA CEREBRAL COM TRODAT <sup>99mTc</sup>

---

## PREPARO

---

- Dieta com restrição de proteínas 48 horas antes do exame (mínimo obrigatório de 24 horas).
- Reduzir ao máximo o consumo de carnes, ovos, laticínios, peixes e leguminosas.
- Alimentos permitidos: Carboidratos, (açúcar, amido, farinha, doces) e gorduras.
- Drogas a serem suspensas com a autorização do médico solicitante:

### **ANFETAMINAS: deve ser suspensa por 7 dias.**

Droga do tipo Anfetamina:

- Dietilpropina ou Anfepramona (Dualid S, Hipofagin S, Inibex S, Moderine);
- Fenproporex (Desobesi-M, Lipomax AP, Inobesin);
- Mazindol (Dasten, Fagolipo, Absten-Plus, Diazinil, Dobesix);
- Metanfetamina (Pervitin\*).

### **METILFENIDATO: deve ser suspenso por 48 horas.**

Droga do tipo Metilfenidato:

- Metilfenidato (Concerta, Ritalina e Ritalina LA)

### **BUPROPIONA: deve ser suspensa por 7 dias.**

Droga do tipo Bupropiona:

- Bupropiona (Wellbutrin, Zyban, Zetron).

### **ANESTESICOS EM GERAL: devem ser suspensos por 3 dias.**

- Ex.: fentanil, ketamina, fenciclina e isoflurane.

Esse exame não é recomendado para mulheres grávidas e em período de amamentação.

## COMO É FEITO O EXAME?

---

- Ao chegar à clínica, o paciente será atendido por uma de nossas recepcionistas para a confecção da ficha cadastral.
- Em seguida, será encaminhado à sala de injeção e uma pequena quantidade do material radioativo será injetada na veia do paciente, preferencialmente do antebraço.
- O paciente deverá aguardar pelo menos 4 horas para a aquisição das imagens. Esse período é necessário para que o traçador concentre na região a ser analisada, entretanto, não é necessário que o paciente permaneça na clínica.
- No retorno, o paciente será encaminhado à sala de exame, será posicionado na maca do aparelho e deverá permanecer deitado por cerca de 30 a 40 minutos para a aquisição das imagens do cérebro.