

ORIENTAÇÕES PARA PESQUISA DE HEMAGIOMA HEPÁTICO

PREPARO

- Esse exame não é recomendado para mulheres grávidas e em período de amamentação.
- Não é necessário jejum.
- Suspende medicamentos tais como: Hidralazina, Prazosin, Propanolol, por 48 horas.
- Doxorrubicina, contraste com Iodo, dextrose, penicilina, digioxina, Metildopa, Quinidina e Heparina (somente sob autorização médica).
- Comunicar o médico nuclear se o paciente está com anemia ou se realizou transfusão sanguínea recentemente.
- Não esquecer de trazer exames de imagem referente a doença a investigar.

COMO É FEITO O EXAME?

- Ao chegar à clínica, o paciente será atendido por uma de nossas recepcionistas para a confecção da ficha cadastral.
- Em seguida, será encaminhado à sala de injeção.
- Uma veia, preferencialmente do antebraço, será puncionada e um medicamento será injetado por esta via. O paciente deverá aguardar 20 minutos e outra injeção será administrada também por via venosa.
- O paciente será encaminhado à sala de exames e posicionado na maca do aparelho.
- Imagens serão adquiridas aos 10-20 minutos após a última injeção e 3 horas após.
- Duração do exame: aproximadamente 4 horas.