

ORIENTAÇÕES PARA TERAPIA COM RADIUM 223 (XOFIGO®)

Inicialmente, o paciente deverá marcar uma entrevista com um dos médicos de nossa equipe. No dia da entrevista, deve levar a cintilografia óssea ou PET-CT ósseo, exames laboratoriais, incluindo hemograma completo recente e pedido médico. O médico nuclear irá informar e orientar sobre o procedimento, além de esclarecer dúvidas pertinentes ao tratamento.

O regime de tratamento recomendado consta de 6 injeções endovenosas, administradas em intervalos de 4 semanas.

PREPARO

- Não é necessário jejum.
- Recomenda-se hidratação abundante prévia (água, sucos, refrigerantes).

COMO É FEITA A TERAPIA?

Ao chegar à clínica, o paciente será atendido por uma de nossas recepcionistas para a confecção da ficha cadastral.

Em seguida será encaminhado à sala de injeção e uma veia periférica, preferencialmente do antebraço, será puncionada e mantida com soro fisiológico.

O medicamento será então injetado na veia e o paciente deverá ser mantido com o soro fisiológico para hidratação.

Após a hidratação, o paciente será liberado para voltar para casa.

ORIENTAÇÕES APÓS A TERAPIA

O paciente será acompanhado pelo médico solicitante e médico nuclear.

Alguns raros casos de mielossupressão foram relatados e, por isso, a avaliação hematológica dos pacientes deve ser realizada no início do tratamento e antes de cada dose do Radium 223.

Os pacientes tratados com quimioterapia prévia e que apresentam sinais de comprometimento da reserva da medula óssea devem ser tratados com precaução.

As reações adversas mais frequentemente observadas foram náuseas, vômitos, diarreia e trombocitopenia.

Devido à excreção fecal do Xofigo®, os pacientes com doença inflamatória intestinal podem apresentar agravamento do processo inflamatório, sendo necessária avaliação cuidadosa nestes casos.