

ORIENTAÇÕES PARA PESQUISA DE CORPO INTEIRO COM 67 GÁLIO

PREPARO

- Esse exame não é recomendado para mulheres grávidas e em período de amamentação.
- Não é necessário jejum e nem suspender os medicamentos em uso.
- Não esquecer de trazer exames de imagem referente à doença em investigação.
- Atentar para o uso de sulfato ferroso e transfusão sanguínea recente.

COMO É FEITO O EXAME?

- Ao chegar à clínica, o paciente será atendido por uma de nossas recepcionistas para a confecção da ficha cadastral.
- Em seguida, será encaminhado à sala de injeção.
- Uma veia, preferencialmente do antebraço, será puncionada e uma pequena quantidade de material radioativo (traçador) será injetada na veia.
- Laxantes serão prescritos para evitar que o material fique retido em alças intestinais.
- O paciente será orientado a retornar à clínica entre 48 e 72 horas após a injeção do traçador.
- Ao retornar, o paciente será encaminhado à sala de exames.
- Na sala de exames, o paciente será posicionado na maca do aparelho e deverá permanecer deitado por aproximadamente 1 hora para a obtenção das imagens.
- Em alguns casos, quando o material não foi eliminado adequadamente, será solicitado que o paciente retorne em outro dia para a aquisição de imagens complementares, lembrando que isso não requer a administração adicional do material radioativo.

Obs.: Solicitamos que informe ao médico nuclear se existe a programação de quimioterapia ou radioterapia entre 24 e 48 horas antes e/ou depois da administração do traçador.