

Orientações para:

Cintilografia das Câmaras Cardíacas (Gated-Repouso) Ventriculografia Radioisotópica



PREPARO:

- Não é necessário jejum.
- Evitar atividade física intensa na véspera do exame.
- Suspender os seguintes medicamentos antes do exame (somente com autorização do seu médico):
Por **72 horas**: Anti-depressivos tricíclicos, Cefalosporina, Ciclosporina, Dextrose, Digoxina, Diltiazem, Doxorubicina, Furosemida, Heparina, Hidralazina, Hidroclortiazida, Metildopa, Mibefradil, Nifedipina, Omeprazol, Penicilina, Prazosin, Propranolol, Quinidina, Sulfassalazina, Verapamil.
Por **5 dias**: Anlodipina.
- Preferencialmente realizar a cintilografia antes de **exames radiológicos com contraste iodado**. Caso já tenha realizado exame radiológico, a cintilografia deve ser agendada depois de pelo menos 2 semanas.
- Caso tenha realizado transfusão de sangue recentemente, agendar o exame após 2 semanas ou mais.
- Os exames de medicina nuclear não são recomendados para mulheres grávidas e em período de amamentação.
- Não se esquecer de trazer os exames de imagem referente à doença a investigar.

COMO É FEITO O EXAME?

Após a confecção da ficha cadastral, o paciente passará por uma breve entrevista para conferência dos dados e de preparo e, em seguida, será encaminhado à sala de injeção. Uma veia periférica, preferencialmente do antebraço, será puncionada para a administração do primeiro medicamento. Após essa etapa, o paciente deverá aguardar 20 minutos para a administração do segundo medicamento (substância radioativa), também por via venosa. Após as injeções, o paciente será encaminhado à sala de exames, onde será posicionado na maca do aparelho. Eletrodos serão fixados no tórax e o paciente deverá permanecer deitado por cerca de 30 a 40 minutos para a aquisição das imagens sincronizadas com o eletrocardiograma.

Ao término do exame, o paciente será liberado sem restrições.

Obs: em alguns casos, o medicamento radioativo será injetado na sala de exames.