

Cintilografia de Viabilidade Miocárdica com Tálcio 201



PREPARO:

- Não é necessário jejum.
- Se possível, trazer por escrito todos os medicamentos que faz uso e também os exames cardiológicos recentes, tais como: o cateterismo, teste ergométrico etc.
- Confirmar sua presença no dia anterior.
- Em caso de desistência, favor comunicar-nos com a máxima antecedência.
- Esse exame não é recomendado para mulheres grávidas e mulheres em período de amamentação.

COMO É FEITO O EXAME?

Após o agendamento, a nossa equipe técnica deverá solicitar a encomenda da dose de Tálcio junto ao IPEN. Esse medicamento é específico para cada paciente e o prazo de entrega é variável. Caso haja desistência, favor avisar com antecedência.

No dia do exame, após a confecção da ficha cadastral na recepção, o paciente passará por uma breve entrevista para conferência dos dados e de preparo.

Em seguida, o paciente será encaminhado à sala de injeção, onde uma veia periférica, preferencialmente do antebraço, será puncionada para administração do material radioativo (Tálcio 201).

Após injeção, o paciente deverá aguardar em torno de 10 minutos para ser direcionado à sala de exames. Na sala de exames, o paciente será posicionado e deverá permanecer deitado na maca do aparelho por cerca de 30 a 40 minutos para obtenção das imagens. Em seguida o paciente será liberado e orientado a retornar em 4 horas para a aquisição de novas imagens. Não é necessário permanecer na clínica neste período de espera. Após o término da aquisição destas imagens, o paciente será encaminhado à sala de injeção e outra dose do mesmo material radioativo será injetada na veia do paciente. O paciente será liberado e orientado a retornar no dia seguinte, para obtenção de outras imagens.

A duração desta etapa é em torno de 40 a 60 minutos.

Obs.: 1) em alguns casos, o estudo poderá ser realizado em condições de estresse (físico ou farmacológico) na primeira etapa, dependendo da solicitação do médico. Favor confirmar com o seu médico, pois caso seja realizado nas condições de estresse, alguns medicamentos e bebidas/alimentos com cafeína devem ser suspensos. Avisar no agendamento do exame.

2) o protocolo de aquisição poderá ser modificado dependendo da análise do médico nuclear.