

Orientações para:

Cintilografia Pulmonar com Gálio 67



PREPARO:

- Não é necessário jejum e nem suspensão dos medicamentos em uso.
- Não se esquecer de trazer exames de imagem referentes à doença a investigar.
- Caso o paciente tenha realizado transfusão sanguínea, utilizado ferro endovenoso ou ter realizado ressonância magnética com contraste, deve-se aguardar pelo menos 24 horas para realizar a cintilografia com Gálio 67.
- Caso tenha realizado quimioterapia, aguardar 3 a 4 semanas para agendar o exame.
- Esse exame não é recomendado para mulheres grávidas e em período de amamentação.

COMO É FEITO O EXAME?

Após a confecção da ficha cadastral na recepção, o paciente passará por uma breve entrevista para conferência dos dados e do preparo, em seguida, será encaminhado para a sala de injeção onde uma veia, preferencialmente do antebraço, será puncionada e uma pequena quantidade de material radioativo (traçador) será administrada.

Depois da administração do traçador, o paciente será liberado e orientado a retornar à clínica entre 48 e 72 horas para aquisição das imagens.

Ao retornar, o paciente será encaminhado à sala de exames, onde será posicionado na maca do aparelho e deverá permanecer deitado por cerca de 20 a 30 minutos para obtenção das imagens.

Ao término do exame, o paciente pode retornar as suas atividades sem restrições.