

# Orientações para:

## Pesquisa de Corpo Inteiro com Gálio 67



### PREPARO:

---

- Não é necessário jejum e nem suspender os medicamentos em uso.
- Não se esquecer de trazer exames de imagem referentes à doença em investigação.
- Caso o paciente tenha realizado transfusão sanguínea, utilizado ferro endovenoso ou ter realizado ressonância magnética com contraste, deve-se aguardar pelo menos 24 horas para realizar a cintilografia com Gálio 67.
- Caso tenha realizado quimioterapia, aguardar 3 a 4 semanas para agendar o exame.
- Esse exame não é recomendado para mulheres grávidas e em período de amamentação.

### COMO É FEITO O EXAME?

---

Após a confecção da ficha cadastral, o paciente passará por uma breve entrevista para conferência dos dados e do preparo. Em seguida será encaminhado à sala de injeção. Uma veia periférica, preferencialmente do antebraço, será puncionada e uma pequena quantidade de material radioativo (traçador) será administrada. Laxantes serão prescritos para evitar que o material fique retido em alças intestinais.

O paciente será orientado a retornar à clínica entre 48 e 72 horas após administração do traçador.

Ao retornar, o paciente será encaminhado à sala de exames, onde será posicionado na maca do aparelho e deverá permanecer deitado por aproximadamente 40 a 60 minutos para a obtenção das imagens.

Em alguns casos, quando o material não foi eliminado adequadamente, será solicitado que o paciente retorne em outro dia para a aquisição de imagens complementares, lembrando que isso não requer a administração adicional do material radioativo.

Obs.: Solicitamos que informe ao médico nuclear se existe a programação de quimioterapia ou radioterapia entre 24 e 48 horas antes e/ou depois da administração do traçador.