

Orientações para:

PET/CT com análogos da somatostatina (PETCT com DOTA)



PREPARO

- Jejum de no mínimo 6 horas, exceto água. Caso o exame esteja agendado no fim da manhã, o desjejum estará liberado, desde que se respeite o jejum de 6 horas antes do exame. Se o exame não for realizado com contraste iodado (contraste de tomografia), o jejum pode ser suspenso.
- O paciente deverá suspender o uso de somatostatina (SANDOSTATIN) pelo menos 1 dia antes do exame. Caso esteja fazendo o uso de somatostatina de depósito (SANDOSTATIN LAR, somatuline, lanreodite, etc.), o período de suspensão é de 4 a 6 semanas.
- **Todo medicamento deverá ser suspenso somente com a autorização do médico solicitante.**
- Tomar bastante água (pelo menos 3 copos) antes do exame, podendo ir ao banheiro normalmente.
- Recomenda-se vestir roupas leves e preferencialmente sem botão, zíper e sem adereços de metal (brincos, colares, relógio, etc.).
- Trazer os exames anteriores tais como; resultado anatomo-patológico, tomografia computadorizada, ressonância magnética e ultrassonografia, pedido médico e uma troca de roupa. Caso o exame anterior esteja gravado em CD, não se esquecer de trazê-lo.

COMO É FEITO O EXAME?

Após a confecção da ficha cadastral na recepção, o paciente passará por uma breve entrevista clínica para conferência dos dados e do preparo. Em seguida, o paciente será encaminhado à sala de preparo e uma veia do membro superior será puncionada e mantida com soro fisiológico.

Uma dose do traçador radioativo será administrada pelo acesso venoso e o paciente deverá permanecer em repouso por aproximadamente 1 hora.

Em seguida, o paciente será encaminhado à sala de exame. Durante todo o tempo da realização deste, o paciente deverá permanecer imóvel, deitado na maca do aparelho. Em média, o tempo de aquisição é de 30 a 45 minutos.

O exame terá início pela tomografia computadorizada, fase de duração rápida, podendo ser ou não utilizado contraste iodado.

Eventualmente, imagens tardias adicionais serão necessárias para complementar o exame.

Orientações para:

O tempo total do exame é variável de paciente para paciente e depende de vários fatores, tais como: altura do paciente, condições clínicas, dose injetada.

Desta forma, solicitamos paciência, pois estaremos realizando o protocolo de aquisição mais adequado para cada situação.

Ao término do exame, o paciente será liberado sem restrições, podendo retornar com a medicação em uso.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

O uso de metformina deverá ser suspenso no dia do exame e até 48 horas após, caso seja utilizado contraste radiológico.

- **Esse exame não poderá ser realizado em mulheres grávidas ou com suspeita de gravidez.**
- **Pacientes que estão amamentando deverão suspender a amamentação por 24 horas após o procedimento.**