

Orientações para:

PET/CT Cerebral



PREPARO:

Na véspera do exame:

- Não há preparo específico.

No dia do exame:

- Jejum de no **mínimo de 4 horas**, exceto água. Caso o seu exame esteja agendado no fim da manhã, o jejum estará liberado desde que se respeite o jejum de 4 horas antes do exame.
- Tomar bastante água (pelo menos 3 copos) antes do exame, podendo ir ao banheiro normalmente.
- Trazer os exames de imagem anteriores e solicitação médica.
- Se possível, não fazer o uso de medicamentos de ação no sistema nervoso central e de cafeína no dia do exame, podendo tomá-los logo após a realização do exame.
- **Caso a glicemia capilar esteja acima de 150 mg/dL, o exame deverá ser remarcado.**
- Checar a glicemia de jejum nos dias anteriores que antecedem o exame. Caso mantenha níveis elevados acima deste nível, entre em contato com os nossos atendentes.

COMO É FEITO O EXAME?

Após a confecção da ficha cadastral na recepção, o paciente passará por uma entrevista para confirmação dos dados e de preparo. Em seguida, o paciente será encaminhado à sala de preparo, onde a glicemia será medida. Se o resultado da glicemia estiver dentro dos limites permitidos para o exame, uma veia do membro superior será puncionada e mantida com soro fisiológico.

O paciente deverá permanecer em repouso sem estímulo luminoso de 15 a 20 minutos. Neste período, uma dose do traçador radioativo será administrada pelo acesso venoso e o paciente deverá permanecer em repouso por mais 30 a 60 minutos. Em seguida, o paciente será encaminhado à sala de exame. Durante todo o tempo da realização deste, o paciente deverá permanecer imóvel, deitado na maca do equipamento, sem movimentar a cabeça.

O tempo médio da aquisição do exame no equipamento é de 10 a 15 minutos.

Ao término do exame, o paciente será liberado sem restrições.



Orientações para:



OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

Pacientes que fazem o uso de insulina deverão consultar os médicos da clínica para que recebam orientações mais específicas de seu preparo. É importante trazer os exames anteriores, tais como; tomografia computadorizada e ressonância magnética, além do pedido médico.

Esse exame não é recomendado para pacientes grávidas.

Caso a paciente esteja amamentando, recomenda-se suspender a amamentação por 24 horas após o exame.